2024年10月1日 星期二



#### 龋齿

徐会玉表示,龋齿是儿童常见的口腔问题之一,过多的糖分摄入以及口腔卫生不佳是导致龋齿的主要原因。在进食后如果没有及时清洁牙齿上的食物残渣,会被细菌分解产生有腐蚀作用的酸性物质,久而久之,被腐蚀的牙齿呈棕褐色或黑色,形成龋洞,健康的牙齿就变成了龋齿(俗称蛀牙或虫牙)。若得不到有效的治疗,龋齿持续发展会导致牙髓炎、根尖周炎等,导致患儿出现牙齿疼痛难忍、牙龈肿胀及面部肿胀等,甚至影响恒牙的生长。因此发现患儿龋齿应尽早治疗,"及时止损"。

#### 乳牙滞留

正常儿童从6岁至12岁乳牙开始逐渐脱落,恒牙依次萌出,未能按时脱落保留在恒牙列中的乳牙,称之为乳牙滞留。乳牙严重滞留会影响到继承恒牙的正常萌出,不利于牙齿的发育,导致牙齿排列不齐等。

乳牙滞留的常见原因有恒牙萌出方向异常;继承恒牙先天缺失、埋伏阻生、异位萌出等;全身因素如佝偻病、外胚叶发育异常等疾病。与此同时,进食较软或饮食过于精细也不利于颌骨的发育及继承恒牙的萌出。若发现乳牙未及时脱落且新牙已萌出,应尽早拔除滞留乳牙。

#### 牙列不齐

"牙列不齐也是常见的口腔问题。"徐会玉

说,牙列不齐不仅影响美观,还会影响颌面部 发育,影响口腔的各项功能如发音、咀嚼等,严 重的牙列不齐可能会造成心理和精神障碍。

牙列不齐的病因有多种。比如先天发育不良,可能是在胚胎发育时期受遗传、药物、放射线等因素影响所致。比如不良的口腔习惯,吮吸手指、吐舌、咬唇、偏侧咀嚼、咬物等。比如乳牙滞留,乳牙没有及时脱落,占据恒牙的位置,导致牙齿排列不齐。家长需要及时纠正儿童的不良习惯,并保证营养元素的摄入,定期带儿童进行口腔检查。如果发现牙齿畸形,应及时进行正畸治疗。

#### 牙外伤

牙外伤也是常见的口腔问题,是指牙齿受急 剧创伤,特别是打击或撞击所引起的牙体硬组 织、牙髓组织和牙周支持组织的损伤。常表现为 牙齿折断、牙齿脱落等,由于儿童好动及自我防 范意识不强等原因,牙外伤的发生尤为常见。

若发生牙齿折断或牙齿脱落,应尽可能找回 牙齿,用清水或牛奶冲洗干净,不要用牙刷等用 力清洁表面,会破坏牙周膜组织。应放在生理盐 水、牛奶中或置于舌下,不要用纸包裹,干燥环 境会使组织受损,并及时就医。即使是乳牙也要 及时就医,否则一旦乳牙的冠部折断,牙神经暴 露,患牙感染后会出现牙髓坏死或根尖周炎,会 影响将来恒牙的发育。

徐会玉提醒家长,儿童口腔健康不容忽视,家长应密切关注儿童的口腔状况,通过调整饮食和日常护理来预防和解决口腔问题。同时,定期带儿童到专业口腔机构进行检查,让儿童在成长过程中拥有健康自信的笑容。



# 负压鼻腔冲洗 让孩子畅快呼吸

#### □潍坊日报社全媒体记者 王路欣 通讯员 刘晓媛

近期,由于气温骤变,儿科门诊呼吸道感染患儿急剧增多,部分患儿出现鼻塞、流涕,尤其是小婴儿因鼻塞、鼻阻出现哭闹不安、拒乳,影响到患儿的生活及睡眠质量,给父母带来了极大困扰。负压鼻腔冲洗,作为一种鼻腔护理的方法,越来越受到家长的关注。

昌邑市人民医院小儿二科的专家表示, 负压鼻腔冲洗作为一种非药物治疗手段,是 借助负压吸引器把鼻腔内的分泌物、病原 菌和过敏原从鼻腔内清洗出去,达到清 洁鼻腔或协同药物治疗的方法。亦可 减轻鼻黏膜水肿,有效缓解上呼 吸道感染引起的鼻塞、流涕 症状。 据介绍,负压鼻腔冲洗的适应症包括:上呼吸道感染引起的鼻塞、流涕、打喷嚏;过敏性鼻炎、慢性咳嗽、慢性鼻窦炎;小儿支气管哮喘、支气管炎、肺炎等伴流涕较多等情况。

负压鼻腔冲洗有许多优点,简单无创、安全性高,对黏液、分泌物冲洗力度大,负压回收良好,不易呛咳,不易引发中耳炎。但需要注意的是,负压鼻腔冲洗时,一定要严格遵照医嘱,而且需要专业人士操作,避免操作不当对身体造成伤害。负压鼻腔冲洗后,患儿还要多注意休息,养成良好的作息规律,饮食清淡,保持充足的睡眠,更有利于患儿病情的恢复。

## 妇幼知识一点诵

## 孕吐只能忍? 试试这些中医方法

#### □潍坊日报社全媒体记者 王路欣 通讯员 韩莎莎

妊娠呕吐俗称孕吐,是指妊娠早期出现严重的恶心呕吐,头晕厌食,是孕早期最常见的症状之一。那么有什么好的中医方法能为广大妊娠呕吐准妈妈缓解不适症状吗?

潍坊市妇幼保健院中医科副主任中医师路 兴军表示,中医认为,孕吐的主要病机为冲气上逆,胃失和降。常见病因为脾胃虚弱、肝胃不和,若病情渐进,可发展为气阴两虚的恶阻 重症。治疗上西医以补液和纠正电解质、酸碱平衡紊乱为主。中医上辨证论治,主要根据呕吐物的性状,结合全身证候、舌苔脉象进行综合分析,辨其寒、热、虚、实,以调气和中、降逆止呕为治疗方法,同时注意饮食和情志的调节。

如果存在脾胃虚弱证,主要证候为:妊娠早期恶心呕吐,甚则食入即吐。口淡,呕吐清涎或食糜,纳呆腹胀。体倦头晕,惰怠思睡。舌淡,苔白,脉缓滑无力。可采取健脾和胃、降逆止呕的治法。方药:香砂六君子汤加减。


对于肝胃不和证,主要证候为:妊娠早期,呕吐酸水或苦水。胸胁满闷,嗳气叹息, 头晕而胀,烦躁口苦,便秘溲赤。舌红,苔薄 黄,脉弦滑。可采取清肝和胃、降逆止呕的治 法。方药:加味温胆汤加减。

以上二证均可因呕吐不止、不能进食,而导致阴液亏损,精气耗散,出现精神萎靡,形体消瘦,双目无神,四肢无力,严重者呕吐带血样物,舌红,苔薄黄或光剥,脉细数无力等气阴两虚的严重证候。可采取益气养阴、和胃止呕的治法。方药:生脉散合增液汤加减。

路兴军表示, 穴位贴敷和针刺治疗亦有明显效果。穴位贴敷根据辨证论治, 选用合适的中药打粉后调制成糊状, 贴在体表穴位上, 安全方便, 无明显不良反应。针刺亦需根据辨证论治原则, 体表取穴, 针法补虚泻实, 宜柔和, 避免强刺激, 能够显著改善胃痛、胃胀、呕吐等不适症状。

此外,耳穴压豆也是一种不错的选择。耳穴压豆是通过压豆刺激耳部对应俞穴,再配合皮质下、交感、神门等穴镇静安神,在缓解妊娠呕吐的同时,还可舒畅孕妇的情志,改善睡眠

路兴军提醒,准妈妈们在生活中还可自行 调整饮食,少食多餐,尽量避免接触容易诱发 呕吐的气味、热、潮湿以及闪光等感觉刺激, 注意体息,散松心棒





### 吃葡萄柚影响服药吗

葡萄柚是常见的水果,那它能否和药同

葡萄柚含有的柚皮素可以抑制肝脏细胞色素P450酶的活性,部分通过此酶代谢的药物,如硝苯地平、美托洛尔、阿托伐他汀等会受其影响,血药浓度升高,从而增加不良反应。

因此吃葡萄柚之前,需查看正在服用的药品说明书,咨询医生和药师,保障自身安全。

潍坊市人民医院 姜俊杰